


ГЕПАСОРБЕКС

адсорбент з посиленою гепатопротекторною та пробіотичною дією на основі полярних та неполярних мінеральних складових

СКЛАД, %

КРЕМНІЮ ДІОКСИД	60,2 - 70,8
АЛЮМІНІЮ ОКСИД	8 - 12
МАГНІЮ КАРБОНАТ	1,0 - 2,5
ТИТАНУ ДІОКСИД	0,8 - 0,15
СЕЛЕН	0,32 - 0,35
КЛІНОПЛЕОЛІТ	4,2 - 4,5
ДРІЖДЖІ АКТИВНІ КОРМОВІ	8 - 10
РОЗТОРОПША ПЛЯМИСТА	18 - 20


Нормалізує морфологію шлунково-кишкового тракту завдяки аглютинації з поверхнею бактерій. Цей комплекс «патоген-дріжджі» швидко виводиться з організму, не колонізуючи ШКТ.



Стабілізує мікрофлору кишківника птиці, ВРХ та свиней та знижує ризики виникнення і розвитку бактеріальних інфекцій завдяки конкурентній боротьбі між різними мікроорганізмами біоценозів за поживні речовини і середовище.



Зміцнює та відновлює слизову оболонку кишківника шляхом видалення патогенних мікроорганізмів та продуктів їх життєдіяльності.



Видаляє патогенні мікроорганізми, звільняючи поживні речовини і місце для розвитку і розмноження корисної мікрофлори, інактивування мікотоксинів і зв'язування важких металів.



ГЕПАСОРБЕКС

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

Зміцнення імунної системи шляхом підвищення активності макрофагів у кишківнику.

Покращення ефективності живлення, зменшення конверсії корму та збільшення економічного ефекту від вирощування продуктивних тварин та птиці.

Підвищення продуктивності та збільшення добових приростів.

Підвищення збереженості та зменшення падіжу.

Відновлення діяльності печінки та імунного статусу організму, підвищення стійкості до захворювань та стресів.

Посилена гепатопротекторна та детоксикаційна дія.

Зберігає свої властивості під час грануляції корму, подовжує термін зберігання.

Адсорбує переважно більшість (75-98%) найпоширеніших в кормах мікотоксинів;



Дозування:
в корм під час їх виготовлення на комбикормових заводах або кормоцехах, шляхом рівномірного змішування, із розрахунку:

ВРХ	0.5 - 3 кг/т
Свині	0.5 - 3 кг/т
Птиця	0.5 - 2 кг/т



GEPASORBEX

сипуча суміш для перорального застосування у ветеринарній медицині

**ГЕПАТОПРОТЕКТОР
ТА ДЕАКТИВАТОР
МІКОТОКСИНІВ**



VSP.COMPANY


ГЕПАСОРБЕКС

адсорбент з посиленою гепатопротекторною та пробіотичною дією на основі полярних та неполярних мінеральних складових

СКЛАД, %


КРЕМНІЮ ДІОКСИД	60,2 - 70,8
АЛЮМІНІЮ ОКСИД	8 - 12
МАГНІЮ КАРБОНАТ	1,0 - 2,5
ТИТАНУ ДІОКСИД	0,8 - 0,15
СЕЛЕН	0,32 - 0,35
КЛІНОПЛЕОЛІТ	4,2 - 4,5
ДРІЖДЖІ АКТИВНІ КОРМОВІ	8 - 10
РОЗТОРОПША ПЛЯМИСТА	18 - 20

Нормалізує морфологію шлунково-кишкового тракту завдяки аглютинації з поверхнею бактерій. Цей комплекс «патоген-дріжджі» швидко виводиться з організму, не колонізуючи ШКТ.



Стабілізує мікрофлору кишківника птиці, ВРХ та свиней та знижує ризики виникнення і розвитку бактеріальних інфекцій завдяки конкурентній боротьбі між різними мікроорганізмами біоценозів за поживні речовини і середовище.

Зміцнює та відновлює слизову оболонку кишківника шляхом видалення патогенних мікроорганізмів та продуктів їх життєдіяльності.



Видаляє патогенні мікроорганізми, звільняючи поживні речовини і місце для розвитку і розмноження корисної мікрофлори, інактивування мікотоксинів і зв'язування важких металів.



GEPA SORBEX

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

Зміцнення імунної системи шляхом підвищення активності макрофагів у кишківнику.

Покращення ефективності живлення, зменшення конверсії корму та збільшення економічного ефекту від вирощування продуктивних тварин та птиці.

Підвищення продуктивності та збільшення добових приростів.

Підвищення збереженості та зменшення падіжу.

Відновлення діяльності печінки та імунного статусу організму, підвищення стійкості до захворювань та стресів.

Посилена гепатопротекторна та детоксикаційна дія.

Зберігає свої властивості під час грануляції корму, подовжує термін зберігання.

Адсорбує переважну більшість (75-98%) найпоширеніших в кормах мікотоксинів;



Дозування:


в корм під час їх виготовлення на комбікормових заводах або кормоцехах, шляхом рівномірного змішування, із розрахунку:

ВРХ	<u>0.5 - 3 кг/т</u>
Свині	<u>0.5 - 3 кг/т</u>
Птиця	<u>0.5 - 2 кг/т</u>

КОНТАКТИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН

+380 68 385 84 35
center@vsp.company



ЗАХІДНИЙ РЕГІОН

+380 68 171 10 08
west@vsp.company

СХІДНИЙ РЕГІОН

+380 93 764 31 53
east@vsp.company

ГОЛОВНИЙ ОФІС

- 📍 м. Вишневе, вул. Київська, буд. 6г
- ☎️ +380 68 385 84 35, +380 44 536 93 40
- @ vetserviceproduct@gmail.com
- 🌐 vsp.company



20 mm

130 mm


370 mm

130 mm

370 mm

850 mm

80 mm




GERASORBEX

25 kg




Виробник: ТОВ «ВЕТСЕРВІСПРОДУКТ»
Тел: +38 068 385 84 35,
Адреса: 08132, Україна, Київська обл.,
Київ-Солом'янський р-н,
м. Вишневе, вул. Київська 6-Г
vetserviceproduct@gmail.com, vsp.company





GERASORBEX

СИПУЧА СУМІШ
ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ



- ✱ АДСОРБУЄ ПЕРЕВАЖНУ БІЛЬШІСТЬ МІКОТОКСИНІВ
- ✱ СТИМУЛЮЄ РОЗВИТКУ ЛАКТО І БІФІДОБАКТЕРІЙ
- ✱ ЗНИЖУЄ КОНВЕРСІЮ КОРМУ, ПІДВИЩУЄ ПРИРІСТ
- ✱ ПРИГНІЧУЄ РОЗВИТОК ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ
- ✱ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОФІЛАКТИКУ МІКОТОКСИКОЗІВ
- ✱ ТЕРМОСТАБІЛЬНИЙ, БЕЗПЕЧНИЙ
- ✱ ВІДНОВЛЮЄ ДЕТОКСИКАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕЧІНКИ
- ✱ ПІДВИЩУЄ ІМУННИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ
- ✱ ВОЛОДІЄ ПОСИЛЕНИМИ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ




GERASORBEX

25 kg




Виробник: ТОВ «ВЕТСЕРВІСПРОДУКТ»
Тел: +38 068 385 84 35,
Адреса: 08132, Україна, Київська обл.,
Київ-Солом'янський р-н,
м. Вишневе, вул. Київська 6-Г
vetserviceproduct@gmail.com, vsp.company



GERASORBEX

СИПУЧА СУМІШ
ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ



СКЛАД		ДОЗУВАННЯ	
Кормова добавка містить наступні активні компоненти (%):		ІЗ РОЗРАХУНКУ НА 1 ТОННУ КОРМУ	
Бентонит		Найбільш оптимальні дози (кг/т корму):	
Кремнію діоксид:		— 1,2-2,0; високий рівень контамінації — 2,2-3,0. При одночасному виявленні двох чи більше видів токсинів в параметрах, що перевищують максимально допустимий їх рівень — рекомендовані вище дози кормової добавки збільшують на 0,5-1,0 кг.	
Алюмінію оксид:		ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ	
Маліно карбонат:		Не має.	
Селен:		Термін придатності: 24 місяці	
Клінолеспіліт:		Вага: 25 кг	
Титану діоксид:		УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ	
Дріжджі активні кормові		Сухе затемнене місце при температурі до 25°C.	
Розторопша плямиста		Термін придатності — 12 міс.	
		в суміші з комбікормом — 3 міс.	
ЗАСТОСУВАННЯ		Дата виробництва:	
Профілактика		кормових мікотоксикозів	
продуктивних тварин і птиці та сприяння		оздоровленню організму від впливу	
мікотоксинів.			



Виробник: ТОВ «ВЕТСЕРВІСПРОДУКТ»
Тел: +38 068 385 84 35, Адреса: 08132, Україна, Київська обл.,
Київ-Солом'янський р-н,
м. Вишневе, вул. Київська 6-Г
vetserviceproduct@gmail.com, vsp.company

