



Mouldblock 103

Інформаційний лист

version 3.2

Mouldblock 103 використовується для захисту кормів та зерна від псування, спричиненого розвитком плісняви. Ріст пліснявих грибів легко виникає під час зберігання, а наявність вільної води внаслідок конденсації може значно прискорити цей процес.

Розвиток плісняви пов'язаний з утворенням мікотоксинів, які навіть у дуже низьких концентраціях можуть негативно впливати на здоров'я та продуктивність тварин.

Mouldblock 103 є економічно ефективним консервантом широкого спектра та тривалої дії, який забезпечує захист кормів і зерна від різних видів плісняви за різних умов зберігання. Продукт зберігає високу стабільність навіть під час високотемпературної обробки.

Mouldblock 103 сприяє підвищенню продуктивності завдяки:

- захисту від розвитку плісняви;
- запобіганню накопиченню мікотоксинів у кормах та сировині;
- збереженню поживної цінності кормів;
- подовженню терміну зберігання.

Склад:

Mouldblock 103 містить кислоти та солі пропіонової кислоти, лимонної кислоти, сорбінової кислоти.

Рекомендоване дозування:

Стандартний захист корму забезпечується при внесенні 500–1000 г на тону корму.

Ефективність захисту від плісняви значною мірою залежить від вологості, активності вільної води, періоду зберігання, температури зберігання, температурних коливань, гігроскопічності, умов зберігання та точності внесення продукту.

На основі багаторічного практичного досвіду рекомендуються такі норми внесення:

Вологість	Термін зберігання	Дозування
12%	3–6 тижнів	0,4 кг/т
13%	3–6 тижнів	0,6 кг/т
14%	3–6 тижнів	0,8 кг/т
12%	2–5 місяців	0,6 кг/т
13%	2–5 місяців	0,8 кг/т
14%	2–5 місяців	1,0 кг/т

Фізичні властивості та зовнішній вигляд:

Форма: порошок

Колір: білий або злегка жовтуватий

Запах: майже відсутній

Упаковка: мішок 25 кг

Термін придатності: рекомендовано використати протягом 24 місяців з дати виробництва

Зберігання: переважно у сухому та прохолодному складському приміщенні.



Mouldblock 217

Інформаційний лист

version 3.2

Mouldblock 217 використовується для захисту кормів та зерна від псування, спричиненого розвитком плісняви. Ріст пліснявих грибів легко виникає під час зберігання, а наявність вільної вологи внаслідок конденсації може значно прискорити цей процес.

Розвиток плісняви пов'язаний з утворенням мікотоксинів, які навіть у дуже низьких концентраціях можуть негативно впливати на здоров'я та продуктивність тварин.

Mouldblock 217 є економічно ефективним консервантом тривалої дії, який забезпечує захист кормів і зерна від широкого спектра пліснявих грибів.

Завдяки ефективному зниженню активності вільної води продукт також може використовуватися для коригування вологості кормів. Для цього Mouldblock 217 розводять у воді та вносять у корм.

Mouldblock 217 сприяє підвищенню продуктивності завдяки:

- захисту від розвитку плісняви;
- запобіганню накопиченню мікотоксинів у кормах та сировині;
- збереженню поживної цінності кормів;
- подовженню терміну зберігання.

Склад:

Mouldblock 217 містить:

- пропіонову кислоту;
- оцтову кислоту;
- їх солі;
- поверхнево-активну речовину (сурфактант).

Рекомендоване дозування:

Стандартний захист кормів забезпечується при внесенні 400–1000 г/т корму.

Необхідна норма внесення значною мірою залежить від умов зберігання, рівня вологості та доступності вільної води.

Для коригування вологості корму:

400–500 г Mouldblock 217 розчинити у 10 л води та внести на 1 тону корму, що дозволяє підвищити вологість корму приблизно на 1%.

Фізичні властивості та зовнішній вигляд:

Форма: рідина

Колір: злегка жовтувато-коричневий

Запах: слабо виражений, різкуватий

Упаковка: каністра 200 кг, IBC-контейнер 1050 кг

Термін придатності: рекомендовано використати протягом 24 місяців з дати виробництва

Зберігання: переважно у сухому та прохолодному складському приміщенні.



Mouldblock 217

Інформаційний лист

version 3.2

Рекомендовані норми внесення

Норми внесення для повноцінного захисту від плісняви значною мірою залежать від вологості матеріалу, активності вільної води, тривалості зберігання, температури зберігання, температурних коливань, гігроскопічності, умов зберігання, точності нанесення препарату та інших факторів.

На основі багаторічного практичного досвіду ми можемо рекомендувати такі норми застосування, наведені нижче.

Зберігання зерна (кг/т)

Вологість	3–6 тижнів	2–3 місяці	6 місяців	1 рік
до 15%	0,50	0,75	1,00	1,50
15%	1,80	2,50	3,00	4,00
17%	2,80	3,50	4,00	5,00
19%	3,30	4,50	5,00	6,50
21%	3,80	5,50	6,00	7,50
23%	4,80	6,50	8,00	10,00

Зберігання кормів (кг/т)

Вологість	3–6 тижнів	2–3 місяці
до 12%	0,40	0,60
13%	0,60	0,75
14%	0,80	1,00